

Kuhifadhi watoto kutokana na ugonjwa wa TB

BCG na Mtoto wako

Mwendo wa kutopatwa na ugonjwa, njia ya usalama sana ya kuhifadhi mtoto wako.

DAWA LA BCG NA MTOTO WAKO

Ukurasa huu inahusika na dawa la BCG (Bacillus Calmette-Guerin) inayotolewa kumhifadhi mtoto wako kutokana na ugonjwa wa Kifua Kikuu (TB).

Nini dawa la BCG?

Dawa la BCG linayo aina fulani ya vijimea vidogo (wadudu) vilivyodhoofika na kusababisha ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa kuwa vimeshadhoofika, havitasababisha kifua kikuu, lakini vitamsaidia mtoto wako kujihifadhi (pasipo ugonjwa) kutokana na ugonjwa huo kama akishikwa na athari zake.

Nini ugonjwa wa Kifua Kikuu?

Ugonjwa wa kifua kikuu ni wa kuambukiza ambayo yaweza kuleta ugonjwa wa meningitis (kivimbe cha ngozi inayofunika obongo) miongoni mwa watoto. Vijana na watu wazima kwa jumla, wanaathiriwa katika mapafu yao, lakini yaweza kuathiri vifuko, obongo ama mifupa. Katika nchi hii, watu kwa jumla wanapona kutokana na utabibu, lakini itachukua miezi mingi.

Namna gani ugonjwa wa kifua kikuu unashikwa?

Waweza kushika kifua kikuu kutoka mwingine kama ameshapata ugonjwa huu katika mapafu ama koo, tena anaendelea kukohoa. Wanapokohoa, wanatupilia vitone ambavyo vina vijimea vidogo vidogo. Kama ukivuta vijimea hivyo, utashikwa na ugonjwa huo pia. Ijapokuwa vitone hivi vyaweza kuwepo hewani kwa muda mrefu, lakini kwa jumla itachukua na kuhitaji uhusiano mrefu wa pamoja na mtu mwenye ugonjwa huu kabla haujaenea miongoni mwa wengine.

Jinsi kifua kikuu inavyoonekana?

Nchini Uingereza, mnamo miaka ya 1950 na baadaye, watu wapatao 50,000 walikuwa wakishikwa na ugonjwa huu kila mwaka. Siku hizi, kiasi hiki kimeshuka hadi kufikia 7,000 ambao washika ugonjwa huu kila mwaka, lakini kiasi hiki ni bado zaidi ya watu 5,500 wanaoshikwa na kifua kikuu kila mwaka katika miaka ya mwanzoni ya 1990. Basi, inatumainiwa kuwa hutashikwa na ugonjwa huu, watu wote lazima wafahamishwe dalili za kifua kikuu. Jambo hili ni muhimu kwa sababu kifua kikuu kimeenea sana pote duniani. Kutokana na watu wengi wanaosafiri pote duniani siku hizi, hatari ya kushika ugonjwa huu pia imezidi kwa kuwa watu ambao wameshaka ama wameshaajiriwa katika nchi za nje watahika ugonjwa huu kutoka wengine ama wataleta ugonjwa huu katika nchi hii.

Dalili nini za kifua kikuu?

Athari za kifua kikuu zitaonekana katika sehemu yo yote ya mwili, basi dalili zake zitakuwa tofauti, na dalili za ugonjwa huu katika mtoto zitatofautiana na zile za mtu mzima. Walakini, kwa kuwa kifua kikuu ni ugonjwa wa kuambukiza, ni muhimu kuwa lazima utambue dalili zake katika mtu mwingine. Inakupasa kuonana na daktari kama mtoto wako, ama ye yote mwingine wa familia yako, ama rafiki yako ana yo yote ya dalili zifuatazo:

- **kikohozi kinachoendelea kwa zaidi ya wiki 3**
- **homa**
- **jasho, hasa katika usiku**
- **kukosa uzito**
- **kujiona uchovu, ama**
- **kukohoa damu**

Kwa nini mtoto wangu anapatiwa dawa la BCG?

Nchini Uingereza, kama nchi nyingi nyingine, dawa la BCG linatolewa kwa watoto ambao waweza kushika haraka ugonjwa wa kifua kikuu kuliko watu wengine wanaohusika na watu wenye maradhi hii. Kwa sababu hao wanakaa katika sehemu zenye hali ya kuvuta ugonjwa huu ama wazazi wao ama mababu wao walihamia kutoka nchi zinazopata ugonjwa huo. Kwa jumla inamaanisha kuwa watoto wanaoishi katika sehemu za katikati za mijini. Dawa hili linatolewa kwa watoto mara baada ya kuzaliwa wakati mtoto bado katika hospitali, lakini dawa hili laweza kutolewa hata baadaye pia.

Jinsi mtoto wangu atajihifadhi kutokana na ugonjwa?

Mtoto wako atatolewa dawa la BCG kupitia sindano kwenye sehemu ya juu ya mkono wa kushoto.

Je, ziko athari zo zote za chanjo?

Mara baada ya chanjo, lengelenge litaonekana. Inamaanisha kuwa chanjo limefanikiwa.

Mnamo wiki 2 hadi 6 tangu kuchanjwa, nishani ndogo itaonekana. Itakuwa ya kuwasha kwa siku chache, lakini itapona polepole kama hufuniki. Baada ya kupona, kovu ndogo itabaki.

Mara nyingi, watoto kadha watakuwa na kidonda kidogo pale walipochanjwa. Kama maji inatoka na kuhitaji kufunikiwa, tumia kitambaa kikavu – lakini usitumie lipu hata kidogo – mpaka kigaga kisipotokea. Kidonda hiki kitachukua miezi mingi ya kupona.

Kama una wasiwasi ama unafikiri kidonda hiki kimeambukizwa, mgusie daktari yako.

Je, sababu yo yote kuwa mtoto wangu asichanjwe dawa la BCG?

Kwa vile ilivyo katika machanjo mengine, mtoto asichanjwe ama kuahirishwa ikiwa mtoto wako:

- mtoto ana homa nyingi
- mtoto ana utabibu wa cancer (kensa) ama ugonjwa mwingine mbaya unaodhoofisha mwili
- ana ugonjwa wa AIDS ama
- ana ugonjwa wa ngozi, kwa vile wa upele mbaya.

Je, nahitaji kujua mambo yo yote mengine?

Mtoto wako aweza kuchanjwa dhidi ya maradhi mengine kama zile za diphtheria, tetanus, kifaduro, polio, Haemophilus influenzae ya aina ya b (Hib) na ngozi inayofunika obongo C wakati umri wake ni miezi 2 bila ya kujali kama anachanjwa kwa ugonjwa wa kifua kikuu.

Walakini, lazima hakikisha kuwa mtoto wako asichanjwe yo yote katika mkono alipochanjwa kwa ugonjwa wa kifua kikuu wa BCG kwa muda wa miezi 3, ama sivyo sehemu kadha za ngozi zitavimba.

Pia hakikisha kwamba habari ya kuchanjwa kwa dawa la BCG imetajwa katika kijitabu cha bi nafasi cha afya ya mtoto (Personal Child Health Record) (PCHR) kwa ajili ya kuhakikishia hapo baadaye.

Nchi ambapo ugonjwa wa kifua kikuu unaonekana kwa wingi

Nchi zilizotajwa hapo chini zina kesi nyingi za kifua kikuu. Kama unajibu '**NDIYO**' kwa swali yo yote, mtoto wako lazima achanjwe kwa dawa la BCG kama hakuchanjwa hapo awali:

- Wewe, familia yako ama baba wa mtoto ama familia yake anatoka mojawapo ya nchi hizo?
- Wewe ama mtoto wako anashauri ya kukaa katika nchi hiyo kwa zaidi ya mwezi mmoja ama kusafiri kwa muda mrefu katika siku zijazo?
- Je, yuko ye yote katika nyumba yako ama mwingine atakayehusika na mtoto wako, aliyekuwa na ugonjwa wa kifua kikuu hapo awali ama anatoka nchi yo yote kati ya nchi hizo?

9

Afghanistan
 Albania
 Algeria
 American Samoa
 Angola
 Argentina
 Armenia
 Azerbaijan

 Bahamas
 Bahrain
 Bangladesh
 Belarus
 Belize
 Benin
 Bhutan
 Bolivia
 Bosnia Herzegovina
 Botswana
 Brazil
 Brunei Darussalam
 Burma (Myanmar)
 Bulgaria
 Burkina Faso
 Burundi

 Cambodia
 Cameroon
 Cape Verde
 Central African Republic
 Chad
 China
 Colombia
 Comoros
 Congo
 Cook Islands

Côte d'Ivoire
 Croatia

 Democratic People's
 Republic of Korea
 Democratic People's
 Republic of Congo
 Djibouti
 Dominican Republic

 Ecuador
 El Salvador
 Equatorial Guinea
 Eritrea
 Estonia
 Ethiopia

 Gabon
 Gambia
 Georgia
 Ghana
 Guam
 Guatemala
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Guyana

 Haiti
 Honduras

 India
 Indonesia
 Iraq

 Japan

 Kazakhstan
 Kenya
 Kiribati
 Kuwait
 Kyrgyzstan
 Korea

 Lao People's
 Democratic
 Republic
 Latvia
 Lesotho
 Liberia
 Lithuania

 Macedonia
 Madagascar
 Malawi
 Malaysia
 Mali
 Marshall Islands
 Mauritania
 Mauritius
 Mexico
 Micronesia
 (Federated
 States of)
 Moldova
 Mongolia
 Morocco
 Mozambique
 Myanmar

10
 Namibia
 Nepal
 New Caledonia
 Nicaragua
 Niger
 Nigeria
 Northern Mariana Islands

 Pakistan
 Palau
 Panama
 Papua New Guinea
 Paraguay
 Peru
 Philippines

 Qatar

 Republic of Korea
 Republic of Moldova
 Romania
 Russian Federation
 Rwanda

 Samoa
 Sao Tome and Principe
 Saudi Arabia
 Senegal
 Serbia & Montenegro,
 Seychelles
 Sierra Leone
 Singapore
 Solomon Islands
 Somalia
 South Africa
 Sri Lanka
 Sudan
 Suriname
 Swaziland
 Syrian Arab Republic

 Tajikistan
 Tanzania
 Thailand

Timor-Leste
 Toga
 Tokelau
 Tonga
 Turkey
 Turkmenistan
 Tuvalu

 Uganda
 Ukraine
 United Republic of Tanzania
 Uzbekistan

 Vanuatu
 Venezuela
 Viet Nam
 Yemen
 Zambia
 Zimbabwe

Kumbuka, utabibu wa ugonjwa wa TB unachukua muda mrefu, uzuiji wake ni rahisi sana.

Simu ya NHS Direct 0845 46 47

Habari Zaidi

Kwa habari zaidi juu ya kujihifadhi, familia na marafiki kutokana na kifua kikuu, unaweza kuulizia:

- NHS Wales Direct kwa simu namba 0845 46 47
- Daktari wako

ama

- TB Alert, shirika linalotoa habari zote juu ya ugonjwa huu na kukabiliana na dalili zake pote duniani

Shirika la TB Alert linaweza kupatikana kwenye:

22 Tiverton Road
London
NW10 3HL
Simu: 0845 456 0995
e-mail: info@tbalert.org
Reg Charity No: 1071886

Unaweza kujipatia habari kutoka mitandao ifuatayo:

www.who.int
www.hpa.org.uk
www.tbalert.org
www.dh.gov.uk
www.immunisation.nhs.uk

Huduma za kiutendaji za NHS Wales Direct Interactive zinatoa habari za kawaida za afya kupitia mkondo wa Television wa aina maalum kwa kutumia ufunguo wa kiutendaji katika chombo cha television.

Ukurasa huu unapatikana kutoka kwa Mganga Mkuu wa Wales kwenye Mtandao wa:

<http://www.cmo.wales.gov.uk/content/work/immunisation/index-e.htm>

katika lugha zifuazo:

KIARABU
KIBULGARIAN
KIBENGALI
KICZECH
KIPSPANIA
KIFARSI
KIFARANSA
KIGUJARATI
KIHINDI
KIKURDISH (KISORANI)
KILINGALA

KIPUNJABI
KIPOLISH
KIRENO
KIRUSSI
KISOMALI
KISWAHILI
KITAGALOG
KIURDU
KIVIETNAMESE
KICHINA

Nakala zake zinaweza kupatikana kutoka mitandao inayohusika ama kuombwa kutoka ofisi za Baraza la Kutunga Sheria:

Public Health Protection Division,
Welsh Assembly Government
Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ

Anwani nyingine:

E-mail: jenny.thorne@wales.gsi.gov.uk
Simu: Neil Robins 029 2082 5397 ama
Matthew Thomas 029 2082 5410

© Crown Copyright Juni 2005
Jarida la Idara ya Afya (Department of Health publication)
Kielelezo: Serikali ya Baraza la Wales



Llywodraeth Cynulliad Cymru
Welsh Assembly Government

SW - SWAHILI