

# Amserlen Imiwneiddio Reolaidd Gyflawn o Ionawr 2020

Pryd	Afiechydion y gwarchodir rhaaddvnt	Brechiad a roddir acerw		Lleoliad arferol <sup>1</sup>
Wyth wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis (y pas), polio, <i>Haemophilus influenzae</i> math b (Hib) a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	Grŵp meningococol B (MenB)	MenB	Bexsero	Clun chwith
	Rotafirws gastroenteritis	Rotafirws	Rotarix	Drwy'r geg
12 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	Niwrococol (13 seroteip)	PCV	Prevenar 13	Clun
	Rotafirws gastroenteritis	Rotafirws	Rotarix	Drwy'r geg
16 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	MenB	MenB	Bexsero	Clun chwith
12 - 13 mis oed	Hib / Grŵp meningococol C (MenC)	Hib/MenC	Menitorix	Rhan uchaf y fraich/clun
	Niwrococol	PCV	Prevenar 13	Rhan uchaf y fraich/clun
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela (brech goch yr Almaen)	MMR	MMRVaxPRO <sup>2</sup> neu Priorix	Rhan uchaf y fraich/clun
	MenB	Hwb-frechiad MenB	Bexsero	Clun chwith
2 <sup>5</sup> a 3 oed a phob plentyn yn yr ysgol gynradd	Ffliw (bob blwyddyn o fis Medi ymlaen)	Brechiad byw y fflw	Fluenz Tetra <sup>2,3</sup>	Dau dwll y trwyn
3 blynedd 4 mis oed	Difftheria, tetanws, pertwsis a pholio	DTaP/IPV	Infanrix IPV neu Repevax	Rhan uchaf y fraich
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela	MMR	MMRVaxPRO <sup>2</sup> neu Priorix	Rhan uchaf y fraich
12 i 13 oed (blwyddyn ysgol 8)	Canser ceg y groth (merched yn unig), rhai canserau pen a gwddw ac anogenhedlol, a defaid gwenerol a achosir gan bapilomafirws dynol (HPV)	HPV <sup>4</sup> (dau ddos 6 i 24 ar wahan)	Gardasil	Rhan uchaf y fraich
14 oed (blwyddyn ysgol 9)	Tetanws, difftheria a pholio	Td/IPV (gwirio statws MMR)	Revaxis	Rhan uchaf y fraich
	Afiechyd grwpiau meningococol A, C, W ac Y	MenACWY	Nimenrix neu Menveo	Rhan uchaf y fraich
	Papilomafirws dynol (HPV)	2 <sup>ll</sup> ddos HPV <sup>6</sup>	Gardasil	Rhan uchaf y fraich
65 oed	Niwrococol	Brechiad polycacarid niwrococol (PPV)	Brechiad polycacarid niwrococol	Rhan uchaf y fraich
65 oed a hŷn	Ffliw (bob blwyddyn o fis Medi ymlaen)	Brechiad fflw anweithredol	Niferus	Rhan uchaf y fraich
70 oed (ond iau nag 80)	Eryr	Eryr	Zostavax <sup>2</sup>	Rhan uchaf y fraich

- Os oes angen dau frechiad neu fwy ar yr un pryd, dylid rhoi'r rhain mewn aelodau gwahanol o'r corff yn ddelfrydol. Os nad yw hyn yn bosib, dylid rhoi brechiadau yn yr un aelod o'r corff 2.5cm oddi wrth ei gilydd. Am fwy o fanylion gweler Penodau 4 ac 11 y Llyfr Gwyrdd. Rhoddir pob brechiad ar ffurf pigiad yn y cyhyrau oni bai y nodir fel arall.
- Mae'n cynnwys gelatin moch.
- Os nad yw Fluenz Tetra yn cael ei gymeradwyo ac os yw'r plentyn mewn grwp risg clinigol, defnyddiwch frechiad fflw pedwarfalent addas heb ei weithredu.
- Os rhoddir y dos cyntaf ar ôl y 15<sup>fed</sup> pen blwydd, mae angen tri dos 0, 2 a 6 mis ar wahan.
- Rhaid i'r plentyn fod yn 2 oed erbyn 31 Awst i gael brechiad y fflw yn rhaglen reolaidd yr ydref/gaeaf.
- Efallai ei bod yn amser 2il ddos HPV.

# Rhaglenni imiwneiddio dewisol

Grŵp targed	Oedran ac amserlen	Afiechyd	Brechiadau
Babanod sy'n cael eu geni i famau wedi'u heintio â hepatitis B	Ar enedigaeth ac 1 mis oed. Hwb-frechiad yn 12 mis oed <sup>1</sup>	Hepatitis B	Brechiadau Hepatitis B (Engerix B/HBvaxPRO)
Babanod mewn ardaloedd o'r wlad gydag achosion o TB $\geq$ 40/100,000	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Babanod â rhiant neu daid/ nain wedi'i eni mewn gwlad gyda llawer o achosion <sup>2</sup>	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Plant mewn grwpiau risg i gael y fflw	O 6 mis i 64 oed	Y fflw	LAIV ar gyfer 2 i 17 oed. Brechiad y fflw anweithredol ar gyfer oedranau eraill neu os cynghorir yn erbyn LAIV
Merched beichiog	Yn ystod tymor y fflw Yn unrhyw gam yn y bechiogrwydd	Y fflw	Brechiad y fflw anweithredol
Merched beichiog	O 16 wythnos yn y bechiogrwydd	Pertwsis	dTaP/IPV (Boostrix-IPV neu Boostrix)
Dynion sy'n cael rhyw gyda dynion	Hyd at ac yn cynnwys 45 oed	HPV	Gardasil

- Hefyd rhoddir Infanrix Hexa (DTaP/IPV/HepB) yn 8, 12 ac 16 wythnos. Cymryd gwaed ar gyfer HBsAg i eithrio haint yn 12/13 mis.
- Os yw nifer yr achosion blynyddol o TB yn  $\geq$  40/100,000 – [www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people](http://www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people)

## Brechiadau ychwanegol i unigolion â chyflyrau meddygol sylfaenol<sup>1</sup>

Cyflwr meddygol	Afiechydon y gwarchodir rhagddynt	Brechiadau gofynnol <sup>2</sup>
Asplenia neu'r dduwg ddim yn gweithio (gan gynnwys clefyd y crymangelloedd a seliag)	Grwpiau meningococol A, B, C, W ac Y Niwmococol Fflw haemofilws math b (Hib) Fflw	Hib/MenC MenACWY MenB PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>
Mewnblaniadau yn y cochlea, hylif serebrosbinol yn gollwng	Niwmcococol	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed)
Cyflyrau anadlol cronig a chyflyrau cronig ar y galon (fel asthma difrifol, afiechyd ysgyfeiniol cronig, a methiant y galon)	Fflw Niwmococol	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>
Cyflyrau niwrolegol cronig (fel Parkinson's neu glefyd motor niwron, neu anabledd dysgu)	Fflw Niwmococol	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>
Diabetes	Fflw Niwmococol	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>
Afiechyd cronig ar yr arenau (CKD) (gan gynnwys haemodialysis)	Niwmcococol (cam 4 a 5 CKD) Fflw (cam 3, 4 a 5 CKD) Hepatitis B (cam 4 a 5 CKD)	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup> Hepatitis B
Cyflyrau cronig ar yr afu/iau	Fflw Niwmococol Hepatitis A Hepatitis B	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup> Hepatitis A Hepatitis B
Haemoffilia	Hepatitis A Hepatitis B	Hepatitis A Hepatitis B
Gwrthimiwnedd oherwydd afiechyd neu driniaeth	Fflw Niwmococol	PCV13 (hyd at ddyflwydd oed) <sup>3</sup> PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>
Anhwylderau cyflawnder (gan gynnwys y rhai sy'n derbyn therapi ataliwr cyflawnder)	Grwpiau meningococol A, B, C, W ac Y Niwmococol Fflw haemofilws math b (Hib) Fflw	Hib/MenC MenACWY MenB PCV13 (i unrhyw oedran) PPV (o ddyflwydd oed) Brechiad blynyddol y fflw <sup>4</sup>

- Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysfawr. Efallai y caiff brechiadau eraill eu hargymell i rai unigolion.
- Edrychwch ar y benod berthnasol yn y Llyfr Gwyrd am amserlen benodol.
- I unrhyw oedran gyda gwrthimiwnedd difrifol.
- O chwe mis oed.