

流感，

宿醉

還是

腦膜炎？

留意您的朋友

您可能已接種C型腦膜炎雙球菌(MenC)疫苗來抵禦C型腦膜炎(meningitis C)，但還是有其它引起腦膜炎及敗血病的病菌存在。它們透過咳嗽、噴嚏或直接接觸，如接吻，等途徑傳播。疾病最可能在一大群人密集生活或工作的地方爆發。

最重要是知道腦膜炎和敗血病可迅速發病，有時只是數小時內的事。

但是，最大的問題是大部分早期病症比較輕微，並與患流感或甚至宿醉的症狀相似，如：

- 嘔吐；
- 感覺發熱；
- 背痛或關節痛；
- 頭痛；
- 脖子僵硬。

不過，如出現以下任何一種症狀：

- 嚴重怕光；
- 迷失方向；
- 有小疹點或斑塊，按壓後不會消散；或者
- 昏迷。

緊急求醫 – 及早治療保護性命

如您能關心您的朋友，問他們感覺如何，則可能會挽救他們的生命。

網站www.wales.gov.uk/immunisation也提供本手冊
或從網頁www.cymru.gov.uk/imiwneiddio獲取以下語言版本：

阿拉伯文、孟加拉文、保加利亞文、英文、捷克文、波斯文、法文、古吉拉特文、印地文、庫爾德文（索路理文）、林格拉文、波蘭文、葡萄牙文、旁遮普文、俄文、索馬裏文、西班牙文、斯瓦希裏文、塔加路文、烏爾都文、越南文。