

Imiwneiddio Rheolaidd Mewn Plentyndod o fis Mawrth 2021

Pryd	Afiechydion y gwarchodir rhagddynt	Brechiad a roddir ac enw		Lleoliad arferol
8 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis (y pas), polio, <i>Haemophilus influenzae</i> math b (Hib) a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	Grŵp meningococol B (MenB)	MenB	Bexsero	Clun chwith
	Rotafeirws gastroenteritis	Rotafeirws	Rotarix	Drwy'r geg
12 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	Niwmococol (13 seroteip)	PCV	Prevenar 13	Clun
	Rotafeirws gastroenteritis	Rotafeirws	Rotarix	Drwy'r geg
16 wythnos oed	Difftheria, tetanws, pertwsis, polio, Hib a hepatitis B	DTaP/IPV/Hib/HepB	Infanrix hexa	Clun
	MenB	MenB	Bexsero	Clun chwith
12 i 13 mis oed	Hib / Grŵp meningococol C (MenC)	Hib/MenC	Menitorix	Rhan uchaf y fraich/clun
	Niwmococol	Hwb-frechiad PCV	Prevenar 13	Rhan uchaf y fraich/clun
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela (brech goch yr Almaen)	MMR	MMRVaxPRO ² neu Priorix	Rhan uchaf y fraich/clun
	MenB	Hwb-frechiad MenB	Bexsero	Clun chwith
2 a 3 oed ⁵ a phob plentyn yn yr ysgol gynradd ⁶	Ffliw (bob blwyddyn o fis Medi ymlaen)	Brechiad byw y fflw	Fluenz Tetra ^{2,3}	Dau dwll y trwyn
3 blynedd 4 mis oed	Difftheria, tetanws, pertwsis a pholio	DTaP/IPV	Boostrix- IPV	Rhan uchaf y fraich
	Brech goch, clwy'r pennau a rwbela	MMR (gwirio bod y dos 1 ^{af} wedi'i roi)	MMRVaxPRO ² neu Priorix	Rhan uchaf y fraich
blwyddyn ysgol 8 (12 a 13 oed)	Canser ceg y groth, rhai canserau pen a gwddw ac anogenedlol, a defaid gwenerol a achosir gan bapilomafeirws dynol (HPV)	HPV ⁴ (dau ddos 6 i 24 mis ar wahân)	Gardasil	Rhan uchaf y fraich
blwyddyn ysgol 9 (13 a 14 oed)	Tetanws, difftheria a pholio	Td/IPV (gwirio statws MMR)	Revaxis	Rhan uchaf y fraich
	Afiechyd grwpiau meningococol A, C, W ac Y	MenACWY	Nimenrix neu Menveo	Rhan uchaf y fraich
	Human papillomavirus (HPV)	HPV 2 nd dose	Gardasil	Rhan uchaf y fraich

- Os oes angen dau frechiad neu fwy ar yr un pryd, dylid rhoi'r rhain mewn aelodau gwahanol o'r corff yn ddelfrydol. Os nad yw hyn yn bosib, dylid rhoi brechiadau yn yr un aelod o'r corff 2.5cm oddi wrth ei gilydd. Am fwy o fanylion gweler penodau 4 ac 11 y Llyfr Gwyrdd. Rhoddir pob brechiad ar ffurf pigiad yn y cyhyrau oni bai y nodir fel arall.
- Mae'n cynnwys gelatin moch.
- Os nad yw Fluenz Tetra yn cael ei gymeradwyo, defnyddiwch frechiad fflw pedwaralent addas heb ei weithredu.
- Os rhoddir y dos cyntaf ar ôl y 15^{ed} pen blwydd, mae angen tri dos 0, 1 a 4 i 6 mis ar wahân.
- Rhaid i'r plentyn fod yn 2 oed erbyn 31 Awst i gael brechiad y fflw fel rhan o raglen reolaidd yr hydref/gaeaf.
- O'r dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn yr ysgol.

Rhaglenni imiwneiddio plant dewisol¹

Gŵptaged	Oedran ac amserlen	Afiechyd	Brechiad gofynnol
Babanod sy'n cael eu geni i famau wedi'u heintio â hepatitis B	Ar enedigaeth ac 1 mis oed. Hwb-frechiad yn 12-13 mis oed ^{2,4}	Hepatitis B	Brechiadau Hepatitis B (Engerix B / HBVaxPRO)
Babanod mewn ardaloedd o'r wlad gydag achosion o TB >= 40/100,000	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Babanod â rhiant neu daid/hain wedi'i eni mewn gwlad gyda llawer o achosion ³	Ar enedigaeth	Twbercwlosis	BCG
Plant mewn grwpiau risg i gael y fflw	6 mis i 17 oed	Y fflw	LAIV ar gyfer 2 i 17 oed. Brechiad y fflw anweithredol ar gyfer oeddrannau eraill neu os cynghorir yn erbyn LAIV

- Efallai yr argymhellir brechiadau eraill ar gyfer unigolion sydd â chyflwr meddygol sylfaenol penodol.
- Cymryd gwaed ar gyfer HBsAg i eithrio haint yn 12/13 mis oed.
- Os yw nifer yr achosion blynyddol o TB yn >= 40/100,000 edrychwch ar www.gov.uk/government/publications/tuberculosis-tb-by-country-rates-per-100000-people
- Hefyd rhoddir Infanrix Hexa (DTaP/IPV/Hib/HepB) yn 8, 12 ac 16 wythnos